Le sida en Asie et dans la région du Pacifique

Interagency Coalition on AIDS and Development
Coalition interagence sida et développement

180, avenue Argyle, Suite 312, Ottawa (Ontario) K2P 1B7 Canada
Téléphone : (613) 788-5107 ❋ Télécopieur : (613) 788-5082
Courriel : info@icad-cisd.com ❋ Site Web : www.icad-cisd.com

Les personnes touchées

À la fin de 2000, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estimaient que 6,5 millions de personnes vivaient avec le VIH/sida, en Asie et dans les archipels du Pacifique. L'épidémie s'est d'abord développée parmi les travailleuses et travailleurs du sexe et les utilisateurs de drogue par injection, mais elle progresse rapidement vers l'ensemble de la population. L'Asie du Sud et l'Asie du Sud-est demeurent les régions les plus touchées; le taux de prévalence est de 0,56%, parmi la population adulte.

Portrait de l'épidémie

- **Les pays les plus durement touchés sont le Cambodge, le Myanmar et la Thaïlande, où la prévalence du VIH dépasse 1%, parmi les 15-49 ans.** Même si on a réussi à ralentir la transmission du VIH parmi les hétérosexuels en Thaïlande, le VIH continue de se propager par le partage de matériel d'injection et les rapports sexuels entre hommes. Le Myanmar a connu des épidémies simultanées de VIH parmi les utilisateurs de drogue par injection, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les hétérosexuels à partenaires multiples.

- **Au Cambodge, l'épidémie est stimulée par une norme sociale selon laquelle les hommes ont des rapports sexuels avant le mariage et hors mariage, habituellement avec des femmes rémunérées.** Par contre, des projets pilotes ont réussi à accroître l'usage du condom chez des hommes qui ont des rapports sexuels extraconjugaux. Si de tels programmes étaient menés à grande échelle et accompagnés d'offres acceptables de travail alternatif pour les femmes pauvres, le Cambodge pourrait être en mesure d'enrayer l'augmentation massive de ses taux d'infection à VIH.

- **Les taux d'infection demeurent faibles, dans la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique.** La prévalence du VIH est de 0,07%, parmi les adultes de cette région, mais on note la présence de facteurs qui pourraient conduire à une hausse importante du taux d'infection, au cours des prochaines années. Le commerce du sexe et l'usage de drogues illégales sont répandus, de même que la migration et la mobilité entre les frontières. À l'heure actuelle, en Chine, les taux de maladies transmises sexuellement croissent rapidement.

- **Une faible prévalence ne se traduit pas nécessairement par un impact limité.** Dans des pays comme la Chine et l'Inde, qui constituent à eux seuls 36% de la population mondiale, un faible taux prévalence se traduit tout de même par un grand nombre de personnes vivant avec le VIH. Au début de 2000, l'Inde comptait 3,7 millions de personnes vivant avec le VIH/sida – un nombre que seule l'Afrique du Sud dépasse.

- **Dans certaines régions du Nord-est de l'Inde, l'utilisation répandue de drogue par injection offre au VIH un point d'entrée de premier ordre.** Au Manipur, la prévalence du VIH parmi les utilisateurs de drogue par injection est passée de zéro (en 1988) à plus de 70% (en 1992); depuis, elle se maintient à ce niveau. Comme on pouvait le prévoir, puisque la majorité des utilisateurs de drogue sont des hommes, ils ont transmis le VIH à leurs partenaires (surtout des femmes). Environ 2,2% des femmes enceintes ont reçu un résultat positif au test du VIH, en 1999.

Cette fiche d'information a été préparée par la Coalitioninteragence sida et développement. La CISD est une coalition d'organisations de développement international et d'organismes communautaires de lutte contre le sida qui vise à mobiliser au Canada des ressources humaines et financières pour combattre le sida dans les collectivités et les pays pauvres en ressources.

Ce document a été réalisé grâce à une contribution de Santé Canada. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue officiels de Santé Canada.

La plupart des renseignements présentés dans ce feuillet sont tirés du document *Le point sur l'épidémie de SIDA – Décembre 2000* (ONUSIDA et OMS) et du *Rapport sur l'épidémie mondiale de VIH/SIDA – Juin 2000* (ONUSIDA).

(1 décembre 2000)