Le sida dans le monde

Interagency Coalition on AIDS and Development
Coalition interagence sida et développement

180, avenue Argyle, Suite 312, Ottawa (Ontario) K2P 1B7 Canada
Téléphone : (613_ 788-5107 ❋ Télécopieur : (613) 788-5082
Courriel : info@icad-cisd.com ❋ Site Web : www.icad-cisd.com

La pandémie de VIH/sida continue de croître à une vitesse alarmante. Chaque jour, 15 000 personnes contractent le VIH. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l'Organisation mondiale de la santé estiment que le nombre de personnes vivant avec le VIH atteignait les 36,1 millions, à la fin de 2000. Au cours de la même année, on a enregistré 5,3 millions de nouveaux cas de VIH et 3 millions de décès dus au VIH/sida. Le bilan des morts de cette épidémie a donc atteint les 21,8 millions. Toutes les régions du monde sont touchées, mais l'Afrique est la plus durement frappée.

La pandémie se propage rapidement parmi les enfants de moins de 15 ans, qui représentent environ 4% des personnes vivant avec le VIH/sida. En 2000, cependant, 11,3% des nouveaux cas de VIH se rencontraient parmi eux.

Plus de 95% de toutes les personnes séropositives au VIH vivent dans des pays en développement, où la maladie affecte surtout de jeunes adultes pendant leurs années de plus grand potentiel de productivité et de fertilité. L'impact du sida sur les gens de ces pays et sur le processus de développement est dévastateur.

Jusqu'à maintenant, 13,2 millions d'enfants de moins de 15 ans ont vu leur mère ou leurs deux parents mourir du sida.

État de la pandémie par région

Afrique

Quelque 25,7 millions d'adultes et d'enfants sont maintenant atteints du VIH/sida, en Afrique, principalement dans la région subsaharienne. Cette partie du continent contient à elle seule les deux tiers des personnes séropositives du monde entier. Plus de la moitié des personnes séropositives y est composée de femmes. Déjà, 17,2 millions de personnes sont décédées de causes liées au sida, en Afrique subsaharienne. Dans certains pays, le taux d'infection à VIH dépasse 20%, parmi la population adulte.

Asie et Pacifique

Puisque les populations de cette région sont parmi les plus nombreuses au monde, elles présentent un potentiel effarant pour l'épidémie. À l'heure actuelle, environ 6,5 millions de gens de cette région du monde sont séropositifs. L'épidémie est accrue principalement par l'injection de drogue, mais le VIH s'étend rapidement vers la population générale.

Amérique latine

En Amérique latine, 1,4 millions de personnes vivent avec le VIH/sida. Le VIH continue de se propager par la voie de rapports sexuels entre hommes, de rapports sexuels entre hommes et femmes, et de l'injection de drogue.

Caraïbe

Dans la Caraïbe, où l'on trouve les taux d'infection les plus élevés hors de l'Afrique, quelque 60 000 nouveaux cas de VIH ont été signalés; la majeure partie de ces cas est attribuée à la transmission hétérosexuelle.

Europe de l'Est

En Europe de l'Est, où l'épidémie s'est manifestée tardivement, le taux de progression de l'infection à VIH était le plus élevé au monde, en 2000. Dans la Fédération de Russie, par exemple, le nombre de nouveaux cas signalés en 2000 dépasse le total de cas déclarés depuis le début de l'épidémie. À l'heure actuelle, 700 000 personnes vivent avec le VIH, dans cette région.

Pays industrialisés d'Amérique du Nord et d'Europe, Australie et Nouvelle-Zélande

Le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida dans l'ensemble de ces pays est d'environ 1,5 millions. De nouvelles combinaisons de médicaments anti-VIH permettent de réduire considérablement le nombre de décès dus au sida, mais le taux de nouveaux cas d'infection à VIH se maintient. Des signes inquiétants portent à croire que les efforts de prévention sont en perte de vitesse. Des milliers d'infections surviennent toujours parmi les hommes ayant des rapports sexuels non protégés avec des hommes. On craint que l'avènement des multithérapies anti-VIH ait entraîné une complaisance face aux dangers du VIH et que cela ait conduit à un relâchement propice aux comportements à risque. On observe aussi que la diminution du nombre de décès attribuables au sida commence à s'atténuer.

Cette fiche d'information a été préparée par la Coalitioninteragence sida et développement. La CISD est une coalition d'organisations de développement international et d'organismes communautaires de lutte contre le sida qui vise à mobiliser au Canada des ressources humaines et financières pour combattre le sida dans les collectivités et les pays pauvres en ressources.

Ce document a été réalisé grâce à une contribution de Santé Canada. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue officiels de Santé Canada.

La plupart des renseignements présentés dans ce feuillet sont tirés du document *Le point sur l'épidémie de SIDA – Décembre 2000* (ONUSIDA et OMS) et du *Rapport sur l'épidémie mondiale de VIH/SIDA – Juin 2000* (ONUSIDA).

(1 décembre 2000)